

Active Ingredients:

Each 400g tube Contains
Thiamine HCl 125.0 mg
Niacinamide 125.0 mg
Vitamin B12 200.0 mcg
Calcium d-pantothenate 12.0 mg
Pyridoxine HCl 10.0 mg
Calcium Chloride 5.0 g
Calcium Phosphate 177.5 g
Cobalt Sulfate 14.7 mg
Copper Gluconate 119.5 mg

Recommended Use: Cal-Paste Plus is a vitamin and mineral supplement for dairy cattle. It provides certain vitamins and minerals to help support normal nutritional levels before, during and after calving.

Recommended Dose:

On Feed - Feeding Directions: Add 400g (one syringe) to the grain ration, 6 to 12 hours prior to calving. Repeat 6 to 12 hours after calving or as directed by a veterinarian.

Oral - Feeding Directions: 400g (one syringe) 6 to 12 hours prior to calving. Repeat 6 to 12 hours after calving or as directed by a veterinarian. Animals mouth must be free of food. Insert nozzle of syringe through the interdental space and deposit the paste on the back of the tongue by depressing the plunger.

Caution: Not for long term use, unless directed by a veterinarian

Storage: Store at room temperature 15 – 30°C.

NN.W5L2

Veterinary Health Product
Produit de santé animale

NET CONTENTS / CONTENU NET: 400g

CAL – PASTE PLUS

A Vitamin and Mineral Supplement for Dairy
Cattle
Un supplement de vitamines et minéraux pour les
vaches laitières.

WARNINGS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
No withdrawal period is required when used
according to the label

**MISES EN GARDE: GARDER HORS DE LA PORTÉE
DES ENFANTS.**

Une période de retrait n'est pas requise lorsque
le produit est utilisé conformément aux directives
de l'étiquette

Can-Vet Animal Health Supplies Ltd.
61 Malcolm Rd. Guelph, ON
800-265-9754

Ingredients Actifs

Chaque 400g tube contient:
Thiamine HCl 125.0 mg
Niacinamide 125.0 mg
Vitamine B12 200.0 mcg
d-pantothenate de calcium 12.0 mg
Pyridoxine HCl 10.0 mg
Chlorure de calcium 5.0 g
Phosphate de calcium dibasic 177.5 g
Sulphate de cobalt 14.7 mg
Gluconate de copper 119.5 mg

L'Utilisation Recommandée : Cal-Paste Plus est un
supplement de vitamines et minéraux destine aux vaches
laitières. Il fournit certains minéraux et vitamines pour
aider à maintenir un niveau nutritionnel normal avant,
pendant et après le vêlage.

Posologie Recommandée:

Incorporation dans l'aliment – Mode d'emploi: Ajouter
400g (une seringue) à la ration grains, 6 à 12 heures
avant le vêlage. Répéter de 6 à 12 heures après le vêlage
out el que recommandé par un vétérinaire.

Voi Orale – Mode D'Emploi: 400g (one seringue) de 6 à
12 heures avant le vêlage. Répéter de 6 à 12 heures
après le vêlage out el que recommandé par un
vétérinaire. La gueule de l'animal doit être libre de toute
nourriture. Insérer l'embout de la seringue dans l'espace
interdentaire et appuyer sur le piston pour déposer la
pâte sur la base de la langue.

Précautions : Ne pas utiliser à long terme sauf sous avis
contraire d'un vétérinaire

Entreposage : Tenir à une température ambiante entre
15-30°C